

Восточная Европа и Центральная Азия

Последние эпидемиологические тенденции

- В 2008 году оценочное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, увеличилось до 1,5 [1,4–1,7] миллиона человек, что на 66% больше по сравнению с 2001 годом, когда это число составляло 900 000 [800 000–1,1 миллиона] человек.
- Показатель распространенности ВИЧ в регионе по-прежнему растет, причем особенно сильный рост эпидемии наблюдается в **Украине** и **Российской Федерации**. Самый высокий уровень распространенности в Европе отмечен в Украине, где в 2007 году показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения составил 1,6% [1,1–2,0%].
- Показатель распространенности ВИЧ превышает 1% в трех странах региона (Российской Федерации, Украине и Эстонии).
- В ряде стран был расширен доступ к антиретровирусной терапии, хотя охват лечением остается довольно слабым. К декабрю 2008 года антиретровирусную терапию получали 22% взрослых, нуждающихся в такой терапии, что более чем в два раза ниже среднего глобального охвата в странах с низким и средним уровнем доходов (42%).
- Имеющиеся данные говорят о том, что потребители инъекционных наркотиков – группа населения, подвергающаяся наиболее высокому риску заражения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, – зачастую реже других получают антиретровирусную терапию.
- Высокие уровни распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков отмечены в **Украине** (38,5–50,3%) и **Российской Федерации** (37%).
- Хотя уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков услугами по профилактике ВИЧ в регионе остается низким, здесь отмечены отдельные случаи успешного расширения услуг по снижению вреда. В **Эстонии** число стерильных шприцев, распространенных на одного потребителя инъекционных наркотиков через программы снижения вреда, удвоилось и составило 112 шприцев.

Динамика развития эпидемии в регионе

- Основным путем передачи ВИЧ в регионе остается употребление инъекционных наркотиков. С учетом роста передачи инфекции среди половых партнеров потребителей наркотиков можно отметить, что во многих странах региона наблюдается переход от эпидемии, в основном концентрирующейся среди потребителей наркотиков, к эпидемии, которая характеризуется ростом передачи инфекции половым путем.
- В 2007 году 57% новых диагностированных случаев ВИЧ в Восточной Европе было обусловлено использованием зараженного инструментария для употребления инъекционных наркотиков. По оценкам, в настоящее время в регионе инъекционные наркотики употребляют 3,7 миллиона человек, причем считается, что примерно четвертая часть из них заражена ВИЧ.

Объединим мир против СПИДа

- В 2007 году в Восточной Европе гетеросексуальными контактами было обусловлено 42% новых ВИЧ-инфекций.
- Поскольку лица, занятые в секс-бизнесе, обычно употребляют инъекционные наркотики, это способствует распространению ВИЧ в регионе. По данным исследований, проведенных в **Российской Федерации**, более 30% работников секс-бизнеса употребляют инъекционные наркотики. В **Украине** показатель распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса колеблется от 13,6% до 31,0%.
- На половые контакты между мужчинами приходится относительно небольшая доля новых инфекций в Восточной Европе и Центральной Азии. В 2007 году лишь 0,4% новых случаев ВИЧ в Восточной Европе было обусловлено половыми контактами между мужчинами.
- Тем не менее показатель распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, составляет 5,3% в **Грузии**, 6% в **Российской Федерации** и от 10–23% в **Украине**.
- Одним из заметных достижений в осуществлении мер в ответ на СПИД в регионе стал высокий уровень охвата услугами по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку. В декабре 2008 года охват услугами по профилактике передачи от матери ребенку в Восточной Европе и Центральной Азии превысил 90%.

Для контактов:

Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org