

Северная Америка, Западная и Центральная Европа

Последние эпидемиологические тенденции

- В 2008 году в странах Северной Америки произошло 55 000 [36 000–61 000] новых случаев ВИЧ-инфекции, а в странах Западной и Центральной Европы – 30 000 [23 000–35 000].
- Прогресс в снижении числа новых ВИЧ-инфекций замедлился в странах с высоким уровнем доходов. В период с 2000 по 2007 годы число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Европе возросло почти в два раза.
- Ежегодное число новых случаев ВИЧ в **Соединенных Штатах Америки** оставалось относительно стабильным с начала 1990-х годов, хотя в 2006 году число новых ВИЧ-инфекций (56 300) было примерно на 40% выше, чем оценивалось раньше.
- В **Канаде**, по оценкам, ежегодный уровень заболеваемости ВИЧ, вероятно, возрастал с 2002 по 2005 годы.
- В Северной Америке, Западной и Центральной Европе национальные эпидемии сконцентрированы в ключевых группах населения, подвергающихся высокому риску, особенно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, потребителей инъекционных наркотиков и иммигрантов. Самые высокие уровни новых ВИЧ-инфекций в этих регионах отмечаются в **США и Португалии**.
- Имеющиеся данные указывают на то, что число новых ВИЧ-инфекций среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, за последнее десятилетие возросло, в то время как показатели распространения новых инфекций среди потребителей инъекционных наркотиков снизились.
- Хотя афроамериканцы составляют 12% населения США, в 2006 году на эту группу приходилось 46% всех случаев ВИЧ и 45% новых случаев заражения ВИЧ.
- Показатели распространенности и заболеваемости ВИЧ среди мужчин в Северной Америке, Западной и Центральной Европе более чем в два раза превышают такие же показатели среди женщин. В 2006 году в **США** на мужчин приходилось 73% новых ВИЧ-инфекций.
- Благодаря широкому доступу к антиретровирусной терапии в странах с высоким уровнем доходов, число смертей, обусловленных СПИДом, значительно снизилось. В **США** в 2007 году число смертей, обусловленных СПИДом было на 69% ниже, чем в 1994 году. В **Швейцарии** снижение уровня смертности от СПИДа было еще более резким – число смертей сократилось с более 600 в 1995 году до менее 50 в 2008 году.
- Проблема ранней диагностики ВИЧ в странах с высоким уровнем доходов до сих пор не решена. 21% людей, живущих с ВИЧ в США, и 27% – в Канаде, не знают о своем ВИЧ-статусе. В целом по Европе процент людей, живущих с ВИЧ, которым диагноз был поставлен на поздних стадиях развития инфекции, колеблется от 15% до 38%.

- Во **Франции, США** и **Соединенном Королевстве** у лиц, заразившихся ВИЧ гетеросексуальным путем, заболевание чаще всего диагностируется на поздней стадии развития инфекции.

Динамика развития эпидемии в регионе

- Секс между мужчинами является преобладающим путем передачи в Северной Америке и Европейском союзе. В **США** число новых ВИЧ-инфекций среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, устойчиво росло с начала 1990-х годов и увеличилось более чем на 50% в период между 1991–1993 и 2003–2006 годами. В **Соединенном Королевстве** число случаев ВИЧ среди МСМ с 2000 по 2007 годы выросло на 74%. В целом по Европе этот показатель возрос на 39% в период с 2003 по 2007 годы.
- Если в Западной Европе на гетеросексуальный путь передачи ВИЧ приходится 29% впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, то в Центральной Европе на этот путь передачи приходится большинство (53%) новых диагнозов ВИЧ.
- Число ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков с начала эпидемии значительно снизилась. В **США** в 1984–1986 годах более 30 000 потребителей инъекционных наркотиков ежегодно заражались ВИЧ, а в 2006 году были инфицированы менее 10 000 человек. В Западной и Центральной Европе в 2007 году на потребителей инъекционных наркотиков приходилось соответственно 8% и 13% новых диагнозов ВИЧ.
- В **Швейцарии**, где в конце 1980-х годов на передачу вируса при потреблении инъекционных наркотиков приходилось большинство диагнозов ВИЧ, в 2008 году на этот путь передачи приходилось всего 4% новых ВИЧ-инфекций. Аналогичным образом, в **Нидерландах** на потребителей инъекционных наркотиков приходилось 5% новых случаев инфекции.
- В Европе передача ВИЧ от матери ребенку была практически искоренена, благодаря наличию услуг по профилактике ВИЧ для беременных женщин.
- В Северной Америке заболеваемость ВИЧ среди младенцев снизилась. В Канаде показатели ВИЧ-инфекции снизились с 22% в 1997 до 3% в 2006 году. В Нью-Йорке число детей до года, у которых был диагностирован ВИЧ, снизилось с 370 в 1992 до 20 в 2005 году.

Контакты:

Софи Бартон-Нотт | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org